## Обучение гиперактивных крыс, лишенных гена транспортера дофамина, в различных поведенческих тестах

**Анна Б. Вольнова**  $^{1}$  , Анастасия Д. Бельская  $^{1}$  , Арина А. Громова  $^{1}$  , Наталия П. Курзина  $^{1}$ 

a.volnova@spbu.ru

Изучение процессов обучения и памяти у крыс, нокаутных по гену (DAT-KO обратного захвата дофамина крысы), представляет ввиду определенные трудности присущих этим животным Крысы DAT-KO поведенческих особенностей. являются моделью синдрома дефицита внимания И гиперактивности успешно Одной используются в разного рода экспериментах. выраженных черт поведения крыс DAT-KO является гиперактивность, не позволяющая им столь же успешно, как и контрольным животным выполнять поведенческую задачу. В ходе длительных экспериментов нами были опробованы различные поведенческие парадигмы и использованы фармакологически подходы для уменьшения выраженности симптомов СДВГ. Были использованы такие тесты как 8лучевой радиальный лабиринт, лабиринт Хебба - Уильямса, Т-образный лабиринт, установка Red Box. Анализ полученных данных позволил выявить особенности выполнения нокаутными животными поведенческой задачи и разработать подходы к улучшению у них процессов обучения и памяти. Кроме того, были выявлены различия в процессах памяти при выполнении тестов, акцентированных главным образом на пространственные ориентиры, и тестов, связанных с реализаций манипуляторных и локомоторных навыков.

В плане более тщательного описания нокаутных животных использование батареи тестов дает возможность проследить частоту проявления различных аспектов отклоняющегося поведения и влияния на них окружающей среды. Наряду с описанием поведенческих

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> St Petersburg University

характеристик применение фармакологических агентов в поведенческих задачах позволяет наметить новые пути купирования синдрома дефицита внимания и гиперактивности у человека.

## This research has been supported by:

1. "PHΦ", grant 25-75-51001