

Двухкомпонентная зрительная система насекомых

Екатерина С. Новикова¹, Богдан О. Скиба^{1,2}, Александра А. Пуйто¹,
Любовь А. Астахова¹, Александр Ю. Ротов¹, **Марианна И.
Жуковская¹**

¹ I.M. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry,
Russian Academy of Sciences

² St Petersburg University

os_sacrum@list.ru

Периферическая фоторецепторная система состоит из пары сложных фасеточных глаз и нескольких простых камерных глазков-оцеллей. Сложные глаза с фоторецепторами разных спектральных классов обеспечивают, по крайней мере у некоторых видов, истинное цветовое зрение, позволяющее различать цвет предметов независимо от интенсивности. Оцелли, чаще всего, оценивают общую освещенность в своем поле зрения. Летающие насекомые обладают более развитыми оцеллями, по сравнению с нелетающими, даже в пределах одного вида [1,2]. Функции оцеллей изучены недостаточно, однако предполагается, что они участвуют в поддержании положения тела в полете и подстройке чувствительности сложных глаз.

У таракана *Periplaneta americana*, ведущего ночной образ жизни, электроретинограмма (ЭРГ), отводимая от сложных глаз, зависит от того, освещаются ли оцелли одновременно с глазами или нет. При одновременной стимуляции оцеллей ЭРГ сложных глаз в ответ на яркие вспышки ультрафиолета меньше, чем в ситуации, когда оцелли не стимулируются. Скорость развития фотответа сложных глаз также существенно зависит от стимуляции оцеллей. Замедление работы сложных глаз позволяет увеличить временное окно для суммации фотонов, попадающих на фоторецепторные мембраны рецепторных клеток, и, соответственно, чувствительность глаза в условиях низкой освещенности.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что оцелли модулируют ответы фоторецепторов сложных глаз в зависимости от уровня освещения.

[1] S.E. Donovan, D.T. Jones, W.A. Sands, P. Eggleton. Biol J Linn Soc. 70 (2000) 467.

[2] A. Narendra, W.A. Ribi. J Exp Biol. 220 (2017) 4383.

This research has been supported by:

1. "РНФ", grant 23-74-01147