

## **Опыт реконструкции условий осадконакопления ипрских отложений Юго-Западного Крыма (опорный разрез г. Сувлу-Кая) по результатам комплексирования петромагнитных и геохимических данных**

**Алексей Ю. Казанский<sup>1,2</sup>**, Екатерина А. Лыгина<sup>3</sup>, Наталья В. Правикова<sup>3</sup>, Екатерина Р. Чижова<sup>3</sup>, Елизавета А. Краснова<sup>3</sup>, Николай А. Ртищев<sup>3</sup>, Татьяна Н. Лубкова<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Геологический институт Российской академии наук

<sup>2</sup> Институт земной коры Сибирского отделения Российской академии наук

<sup>3</sup> Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

[kazansky\\_alex@mail.ru](mailto:kazansky_alex@mail.ru)

Опорный разрез г. Сувлу-Кая расположен в Бахчисарайском стратотипическом районе. Он сложен отложениями глинисто-карбонатного состава в нижней и известняками в верхней части разреза. По результатам петромагнитных исследований установлено, что магнитная восприимчивость пород на 60-90% определяется присутствием парамагнитных (глинистых) минералов, которые на основе корреляции с петрогенными оксидами и редкими элементами, индикаторами терригенного осадконакопления, имеют осадочное происхождение. Ферримагнитная и суперпарамагнитная (SP) составляющие магнитной восприимчивости, не имеют значимой корреляции с этими оксидами, и, частично, имеют биогенную природу. При этом корреляция геохимических данных с параметрами, характеризующими доменное состояние и размер магнитного зерна незначима, что подтверждает частично биогенную природу ферримагнетиков. Исключение представляет жесткая часть остаточной намагниченности насыщения, корреляция которой с индикаторами терригенного осадконакопления значима, то есть магнитожесткие магнитные минералы, в основном, обломочные. Разложение производной кривой создания остаточной намагниченности насыщения

на отдельные коэрцитивные спектры позволило выявить 6 компонент, отвечающих различным минеральным группам со своим положением максимума коэрцитивного спектра: педогенная и внеклеточная бактериальная (Ex), терригенная (D), биогенная «мягкая» (Bs), биогенная «жесткая» (Bh), «жесткая» гематитовая (Hh), «жесткая» гётитовая (Hg) компоненты. Интервалы одновременного сокращения привноса парамагнитного и всех компонент ферримагнитного материала в бассейн рассматриваются как скрытые перерывы двух типов. Первый характеризуется одновременным резким сокращением парамагнитного и ферримагнитного материала. Второй тип отличается появлением в коэрцитивном спектре компоненты Hg с одновременным исчезновением компоненты Bh, что говорит об окислительной обстановке. Эти перерывы являются структурами «твердого дна». Во всех интервалах доля биогенной магнитной составляющей (Bs+Bh) становится меньше доли терригенной составляющей (D+Hh), а SP частицы отсутствуют. Общее снижение биогенных компонент говорит об угнетении биопродуктивности на данных интервалах. В преимущественно карбонатных слоях биопродуктивность увеличивается при сохранении привноса терригенных ферримагнетиков. Работа выполнена с использованием стереомикроскопа Olympus SZX16, приобретенного по программе развития МГУ, и материалов ЦКП "Геопортал" МГУ имени М.В. Ломоносова

## **Исследование проведено при поддержке:**

1. "Геологический институт Российской академии наук", грант Госзадание AAAA-A21-121011590055-6